

CARACTERIZAÇÃO DE FRUTOS DE UVAIA COLETADOS EM DIFERENTES LOCALIDADES DA REGIÃO SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

Lorena Abdalla de O. Prata Guimarães¹

Guilherme Carneiro de Mendonça²

André Angelo Bellon³

Raiza Rainha Dorzenoni⁴

Tiago de Oliveira Godinho⁵

Resumo: A uvaia (*Eugenia pyriformis*) tem grande potencial para uso na dieta alimentar. Para ampliar o conhecimento sobre frutíferas nativas não tradicionais, este trabalho objetivou caracterizar frutos de uvaia coletados em quatro localidades da região serrana do ES - Venda Nova do Imigrante (L1), Marechal Floriano (L2) e Domingos Martins (L3 e L4). Foram avaliadas a relação comprimento/diâmetro, rendimento da polpa, massa dos frutos inteiros e sem sementes, sólidos solúveis totais (SST), pH, acidez titulável (AT), vitamina C e "ratio" (SST/AT). Os frutos das diferentes localidades têm grande variabilidade nas características químicas e morfológicas. Os maiores frutos foram os obtidos na localidade de Vitor Hugo (L2). A polpa dos frutos obtidos em L2 e na localidade de São João de Viçosa (L1) tiveram, em geral, características químicas mais desejáveis. Por serem os frutos muito saborosos, com teores de vitamina C elevados e por serem suas potencialidades pouco exploradas, a espécie merece e precisa ser amplamente estudada e cultivada.

Palavras-chave: *Eugenia pyriformis*; Frutas nativas; Produtos florestais não madeireiros; Vitamina C.

¹ Incaper/CRDR Centro Serrano, Brasil. E-mail: lorena.prata@hotmail.com.

² Iema/Programa Reflorestar, Brasil. E-mail: guic_m@yahoo.com.br.

³ Incaper/CRDR Centro Serrano, Brasil. E-mail: aa-bellon@hotmail.com.

⁴ Incaper/CRDR Centro Serrano, Brasil. E-mail: raiza_rainha_vni@hotmail.com.

⁵ Incaper/CRDR Centro Serrano, Brasil. E-mail: godinhoto@hotmail.com.